

THS : initiation chez les femmes ménopausées symptomatiques

La nature

dans la peau



Œstrodose®

Gel cutané de 17β estradiol, concentration à 0,06%

le gel au quotidien

ŒSTRODOSE 0,06 pour cent, Estradiol 17 β. FORME ET PRÉSENTATION : Gel pour application cutanée en flacon avec pompe doseuse. **COMPOSITION :** Estradiol (DCI) anhydre 0,75 mg/pression. Excipients q. s. **INDICATIONS :** • Corrections des carences estrogéniques et des symptômes de déficit en estrogènes notamment liés à la ménopause naturelle ou artificielle : troubles vasomoteurs (bouffées de chaleur, sueurs nocturnes), troubles trophiques génito-urinaires (atrophie vulvo-vaginale, dyspareunie, incontinence d'urine) et troubles psychiques (troubles du sommeil, asthénie...). • Prévention de l'ostéoporose post-ménopausique chez la femme ayant un risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :** Voie transdermique. En moyenne 2 pressions par jour, 24 à 28 jours par mois. L'effet sur la perte osseuse n'est pas observé chez toutes les patientes. La posologie sera éventuellement adaptée après 2 ou 3 cycles de traitement. **Un traitement progestatif devra être associé pendant au moins 12 jours par mois.** Le gel ne doit pas être appliqué sur les seins ou sur les muqueuses. CTJ : 0,18 €. **CONTRE-INDICATIONS :** *Ne doit pas être prescrit dans les situations suivantes :* - accident thrombo-embolique veineux en évolution ; - accident thrombo-embolique artériel en évolution (notamment coronarien ou cérébral) ; - tumeurs malignes estrogéno-dépendantes connues ou suspectées (par exemple cancer du sein ou de l'utérus) ; - hémorragies génitales non diagnostiquées ; - atteinte hépatique sévère ; - hypersensibilité connue à l'un des composants. *Bien que sous traitement les facteurs de coagulation ne soient pas modifiés à court terme, ce médicament est aussi généralement déconseillé dans les situations suivantes (par mesure de prudence en l'absence de données épidémiologiques suffisantes) :* - cardiopathie emboligène ; - antécédent personnel thrombo-embolique veineux récent et documenté. **MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :** **MISES EN GARDE :** • Si les symptômes persistent, passer à une posologie plus forte ou passer à une autre forme ou à une autre voie d'administration. • Les risques de cancer de l'endomètre augmentent lors d'administrations isolées et prolongées d'estrogènes, il est donc hautement recommandé d'associer un progestatif pendant une durée d'au moins 12 jours par mois. • Avant de débuter ou de modifier un traitement hormonal substitutif de la ménopause (THS), il est indispensable d'effectuer un examen clinique et gynécologique complets (y compris le recueil des antécédents familiaux). Pendant toute la durée du traitement, des examens réguliers seront effectués, leur nature et leur fréquence étant adaptées à chaque patiente. Un examen des seins et/ou une mammographie seront également réalisés si nécessaire en fonction de chaque patiente. • Des études cas-témoins ont montré que le traitement hormonal substitutif (THS) est associé à un risque accru d'accident thrombo-embolique veineux, de 1 cas par an pour 10000 femmes dans la population générale à 2-3 cas par an pour 10000 patientes sous THS. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** • Examen médical nécessaire avant et périodiquement en cours de traitement ; essentiellement : seins, utérus, tension artérielle, poids. • THS instauré après évaluation de la pathologie vasculaire et/ou métabolique, surveillance régulière exercée, en cas de : - accident ischémique cérébral lié à l'athérosclérose, - hémorragie cérébrale, - occlusion veineuse rétinienne, - obésité en raison du risque thrombotique veineux, - allaitement et intervention chirurgicale (intervention programmée, il est souhaitable d'interrompre le traitement un mois avant), - diabète compliqué (en particulier par une microangiopathie), - hypertension artérielle. • Bénéfices et risques du traitement évalués et surveillés de près en cas de : - endométriose, - hyperplasie de l'endomètre, fibrome utérin, - tumeur bénigne du sein, - lupus érythémateux disséminé, - tumeur hypophysaire à prolactine, - porphyrie. • Surveillance attentive en cas de : cholestase récurrente ou prurit récidivant lors d'une grossesse, insuffisance rénale, épilepsie, asthme, antécédents familiaux de cancer du sein, troubles des fonctions hépatiques, otospongiose. **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :** - Associations nécessitant des précautions d'emploi : + Inducteurs enzymatiques Diminution de l'efficacité de l'estrogène. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT :** Non indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. **EFFETS INDÉSIRABLES :** • Interrompre le traitement en cas de : - accident cardiovasculaire et thromboembolique ; - ictere cholestatique ; - mastopathie bénigne, tumeur utérine (par exemple : augmentation d'un fibrome) ; - adénome hépatique ; risque d'accidents hémorragiques intra-abdominaux ; - galactorrhée (rechercher l'existence d'un adénome hypophysaire). • Signes d'hypoestrogénie : - bouffées de chaleur persistantes ; - céphalées banales, migraines ; - sécheresse vaginale ; - irritation oculaire par les lentilles de contact. • Signes d'hyperestrogénie : - nausées, vomissements, crampes abdominales, flatulences ; - tension mammaire ; - irritabilité ; - jambes lourdes ; - exacerbation de la sécrétion de la glaire cervicale. • Autres effets indésirables : - Métorragies (rechercher une pathologie sous-jacente, en particulier de l'endomètre), - exacerbation d'une comitativité, - chloasma ou mélasma qui peut être persistant. **PHARMACODYNAMIE :** Classe ATC G03CA03 ESTROGÈNE NATUREL (G : système génito-urinaire et hormone sexuelle). **PHARMACOCINÉTIQUE :** Cf. VIDAL. **Liste II. AMM 338 292.4 (1990, dernière modification 12/2003).** **Prix :** 5,86 €. Remb. Sec. Soc. à 65%. Collect. Pour une information plus complète, consulter le dictionnaire Vidal. Laboratoires Besins International, 5 rue du Bourg l'Abbé, 75003 Paris.

Laboratoires
Besins International
Spécialiste en hormonothérapie

**5ème SEMINAIRE INTENSIF DE REFLEXION
EN GYNECOLOGIE – OBSTETRIQUE
ANESTHESIE – NEONATALOGIE**

Crédit photo - <http://www.mi-aime-a-ou.com/>

Lundi 14 au Vendredi 18 Mars 2005

ILE DE LA REUNION

Club de Périfcétologie



PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Les thèmes suivants seront abordés par :

V. AUBARD (Limoges), Y. AUBARD (Limoges), G. BARAU (La Réunion), D. BENHAMOU (Paris), H. COHEN (Paris), M. COMPAIN (La Réunion)
L. EDELMAN (IPP Paris), P. EDELMAN (Paris), P. GIRARDIN (La Réunion), P. GUERRE (Bayonne),
M. HEIZERT (La Réunion), E. JANKY (Pointe à Pitre), M. LEVARDON (Paris), J. C. MANUGUERRA (IPP Paris), B. NEVEU (Paris),
F. PEREZ (Montpellier), F. PERROTIN (Tours), H. PETERMAN (Paris), J.C. PONS (Grenoble), P.Y. ROBILLARD (La Réunion),
J.C. ROZE (Nantes), P. ROZENBERG (Poissy), S. SAINT-LEGER (Montreuil), A. TREISSER (Monaco), R. WAINER (Poissy).

INFECTIOLOGIE

Les maladies émergentes - Immunité maternelle / Morbidité/ Mortalité - Recommandations pour l'antibioprophylaxie en Obstétrique - Vaginose et accouchement prématuré - Faut-il dépister la varicelle et le parvovirus pendant la grossesse ? - Facteurs de risque d'infection néonatale - Dépistage du Strepto B - Résultats préliminaires de l'enquête du CHU de Pointe-à-Pitre - Antibioprophylaxie et chirurgie pelvienne

ORGANISATION DES SOINS

Les nouveaux outils de l'évaluation des pratiques professionnelles en Gynécologie-Obstétrique - Cartographie, gestion et prévention des risques - Procédures contre les infections nosocomiales et résultats de l'enquête de l'Institut Mutualiste Montsouris - Externalisation et transferts de compétence dans les services de Gynécologie-Obstétrique

PRE-ECLAMPSIE - PVP

L'épidémiologie de la pré-éclampsie - Pré-éclampsie : objectifs thérapeutiques - Synthèse des Recommandations Françaises 2003 et Américaines 2004 pour l'héparinothérapie dans la PVP - Dépistage de l'insuffisance placentaire par l'association doppler utérin et iliaque en population à haut risque

HEMODYNAMIQUE et OXYGENATION

Transfert transplacentaire des anesthésiques - Césarienne : anesthésie loco-régionale (Hypotension maternelle ; Pronostic fœtal de l'hypotension) - Arrêt cardiaque chez la femme enceinte - Adaptation à la vie extra-utérine (sur les gestes en salle de travail ; Qui doit faire la réanimation en salle de travail)- Transfusion sanguine : conditions de l'hémovigilance

STERILITE, GYNECOLOGIE et CHIRURGIE

Que reste-il des indications chirurgicales dans le traitement de la stérilité ? - Oncoplastie radicale Chirurgie de l'incontinence - Pratique-t-on trop d'épisiotomies ? - FSH recombinantes versus urinaires - Risques Thrombotiques du THS

ACTUALITES

Actualisation des données sur la macrosomie - Aspects éthiques du traitement préventif par les anticorps anti-rhésus polyclonaux de la maladie hémolytique du nouveau-né - L'enquête de pratiques obstétrico-pédiatrique dans la grande prématurité - Que penser des Recommandations ANAES 2003 sur les ventriculomégalies cérébrales fœtales - Décollement des membranes à terme - L'IVG médicamenteuse et les réseaux de médecins généralistes - Sièges et voie basse : la polémique est-elle close ?

Le programme détaillé est consultable sur le site du CPF <http://www.cpf.free.fr>

INSCRIPTION AU SEMINAIRE

• Médecins	230,00 €
• Chefs de Clinique, Internes, Sages-Femmes	150,00 € (justificatif demandé)
• Médecins installés à La Réunion	120,00 €
• Chefs de Clinique, Internes, Sages-Femmes installées à La Réunion	75,00 € (justificatif demandé)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Votre inscription sera effective dès réception du chèque libellé à l'ordre du Club de Périfoetologie

à retourner sous enveloppe au :

CLUB DE PERIFOETOLOGIE - 38, rue Beaujon , 75008 PARIS – France

Nom (en majuscules) : Prénom :

Spécialité :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Téléphone : Fax : E-mail :

Inscription au séminaire : 230,00 € 120,00 € 150,00 € 75,00 €

Le Club de Périfoetologie est un organisme formateur agréé sous le numéro 11753072275

LE SEJOUR

- **Départ de PARIS le Samedi 12 Mars 2005 en fin de journée**
Arrivée à La Réunion le Dimanche matin – Transfert à l'hôtel Les Villas du Lagon – Journée libre.
- **Lundi 14 Mars 2005**
De 16 h 00 à 20 h30 : réunion de travail à l'hôtel Les Villas du Lagon.
- **Mardi 15 Mars 2005**
De 16 h 00 à 20 h30 : réunion de travail à l'hôtel Les Villas du Lagon.
- **Mercredi 16 Mars 2005**
De 16 h 00 à 20 h30 : réunion de travail à l'hôtel Les Villas du Lagon.
- **Jeudi 17 Mars 2005**
De 16 h 00 à 20 h30 : réunion de travail à l'hôtel Les Villas du Lagon.
- **Vendredi 18 Mars 2005**
Journée Libre.
- **Samedi 19 Mars 2005**
Journée libre – Départ pour Paris en fin de journée.
- **Dimanche 20 Mars 2005**
Arrivée à Paris le matin

EN PARTENARIAT AVEC



INSCRIPTION / TARIFS

- **Vol et Hébergement/personne :** **1360,00 €**
1/ Vol régulier Air Austral Paris/Saint-Denis/Paris
Taxes d'aéroport, assurance rapatriement – annulation – transferts compris
2/ Séjour Hôtel Les Villas du Lagon **** 6 nuits : petits déjeuners – chambre double
3/ Pauses café incluses
- Supplément single : 295,00 €
- Tarif enfants – 12 ans logé avec 2 adultes : 779,00 €



BULLETIN à retourner sous enveloppe à :
MARNE-LA-VALLÉE-VOYAGES - Centre Commercial Bay - 77090 COLLEGIEN

Participants (*Date de naissance pour les enfants*)

Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Aresse :
Code Postal : Ville : Téléphone :



Pour tout renseignement concernant :

Le programme scientifique
Club de Perifoetologie Formation
38, rue Beaujon - 75008 Paris
Tél/Fax : 01 46 05 12 45
e-mail : cpf@club-internet.fr
SiteInternet : www.cpf.free.fr

L'organisation touristique
Marne-La-Vallée Voyages
Centre Commercial Bay - 77090 COLLEGIEN
Tél : 01 60 17 58 20
Fax : 01 60 17 62 06
e-mail : marne.la.vallee.voyages@wanadoo.fr